

## Forsiktighetsregler ved bruk av antiparasittære midler til hund og katt under drektighet og laktasjon

15.06.21

Legemiddel	Dyre- art*	Virkestoff	Under drektighet	Under laktasjon
<i>Anthelmintika</i>				
Banminth vet.	H	Pyrantel	Kan gis til drektige dyr (Banminth vet., Plumb).	Kan gis til lakterende dyr (Banminth vet., Plumb).
Droncit vet.	H K	Prazikvantel	Studier utført på hund, katt, rotte og kanin viser ingen embryotoksisk eller teratogen effekt ved orale doser på opptil 300 mg/kg (Droncit vet.). Kan gis til drektige hunder og katter (Droncit vet., Plumb).	Går over i melk i konsentrasjoner på ca 25 % av det som finnes i maternalt serum, men det er usannsynlig at det er skadelig for ammende avkom (Plumb). Kan gis til lakterende hunder og katter (Droncit vet.).
Drontal vet.	K	Prazikvantel + pyrantel	Kan brukes under drektighet (Drontal vet., Plumb).	Kan brukes under diegiving (Drontal vet., Plumb).
Drontaste	H	Prazikvantel + pyrantel + febantel	Kontraindisert i 1. og 2. trimester, da sikkerhet ikke er undersøkt. 1 behandling i 3. trimester er trygt (Drontaste).	1 enkelt behandling under diegiving er trygt (Drontaste).
Profender	K	Prazikvantel + emodepsid	Sikker bruk av denne kombinasjonen har ikke blitt evaluert i katter under drektighet. Studier i rotte og kanin tyder på at emodepsid kan interferere med fetal utvikling i disse artene (Plumb). Kan brukes under drektighet (Profender).	Sikker bruk av denne kombinasjonen har ikke blitt evaluert til lakterende katter (Plumb). Kan brukes under laktasjon (Profender).
Panacur vet.	H K	Fenbendazol	Ingen uheldige effekter på foster er vist. Teratogene effekter hos hund og katt kan ikke utelukkes fullstendig, og behandling i de 2 første trimestrene skal derfor baseres på nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær. (Panacur vet.). Anses trygt under drektighet (Plumb).	Kan gis til lakterende dyr. Fenbendazol skiller ut i melk, men har ingen virkning på diende avkom (Panacur vet.).
Welpan vet.	H	Febantel + pyrantel	Skal ikke brukes til drektige tisper (Welpan vet.). Markedsført til valper og unghunder.	Skal ikke brukes til lakterende tisper (Welpan vet.). Markedsført til valper og unghunder.

Legemiddel	Dyre- art*	Virkestoff	Under drektighet	Under laktasjon
<i>Ektoparasittmidler</i>				
Exspot vet.	H	Permetrin	Skal ikke gis til drektige tisper (Exspot vet.).	Kan gis til lakterende tisper (Exspot vet.).
Scalibor vet.	H	Deltametrin	Kan brukes under drektighet (Scalibor).	Kan brukes under laktasjon (Scalibor).
Bayvantic vet.	H	Permetrin + imidaklopid	Kan brukes under drektighet (Bayvantic).	Kan brukes under laktasjon (Bayvantic).
Seresto vet.	H K	Flumetrin + imidaklopid	Ikke anbefalt til tisper eller hunnkatter under drektighet, da sikkerhet ikke er klarlagt (Seresto vet.).	Ikke anbefalt til tisper eller hunnkatter under laktasjon, da sikkerhet ikke er klarlagt (Seresto vet.).
Frontline vet. påflekkingsvæske	H K	Fipronil	Kan brukes til drektige tisper og katter (Frontline vet.).	Kan brukes til lakterende tisper og katter (Frontline vet.).
Frontline vet. spray	H K	Fipronil	Sikkerhet ved bruk til drektige hunder og katter er ikke dokumentert (Frontline vet. spray).	Sikkerhet ved bruk til diegivende hunder er ikke dokumentert (Frontline vet. spray).
Frontline Comp.	H K	Fipronil + (S)-metopren + amitraz	Kan brukes til drektige tisper og katter (Frontline Comp.).	Kan brukes til diegivende tisper (Frontline Comp.). Potensiell toksisitet for kattunger < 8 uker, i kontakt med en behandlet hunnkatt, er ikke dokumentert. Forsiktighet bør utvises i slike tilfeller (Frontline Comp.).
Prac-tic	H	Pyriprol	Fullstendig dokumentasjon for bruk under drektighet er ikke klarlagt. Det er ikke observert tegn på relevante effekter på reproduksjon eller fosterutvikling i studier på laboratoriedyr (Prac-tic).	Fullstendig dokumentasjon for bruk under laktasjon er ikke klarlagt (Prac-tic).
NexGard	H	Afoksolaner	Sikkerhet ved bruk under drektighet er ikke klarlagt. Skal bare brukes i samsvar med nytte/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær (NexGard, Plumb).	Sikkerhet ved bruk under diegiving er ikke klarlagt. Skal bare brukes i samsvar med nytte/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær (NexGard, Plumb).

Legemiddel	Dyre- art*	Virkestoff	Under drektighet	Under laktasjon
Bravecto tyggetabletter	H	Fluralaner	Preparatet kan brukes under drektighet (Bravecto tyggetabletter). En undersøkelse med dosering med 3 x normaldose til drektige tisper viste abnormaliteter hos valper. Nytte/risiko (Plumb).	Preparatet kan brukes under laktasjon (Bravecto tyggetabletter).
Bravecto påflekkingsvæske	H K	Fluralaner	Preparatet kan brukes til drektige tisper. Sikkerhet ved bruk til drektige katter er ikke klarlagt. Skal kun brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær (Bravecto påfl.).	Preparatet kan brukes til diegivende tisper. Sikkerhet ved bruk til diegivende katter er ikke klarlagt. Skal kun brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær (Bravecto påfl.).
Credelio	H K	Lotilaner	Sikkerhet ved bruk til drektige hunder/katter er ikke klarlagt. Bruk skal samsvare med nytte-/risikovurdering (Credelio, Plumb).	Sikkerhet ved bruk til diegivende hunder/katter er ikke klarlagt. Bruk skal samsvare med nytte-/risikovurdering (Credelio, Plumb).
Simparica	H	Sarolaner	Sikkerhet ved bruk under drektighet er ikke undersøkt. Dyrestudier har ikke vist teratogene effekter. Brukes kun etter nytte-/risikovurdering (Simparica).	Sikkerhet ved bruk under laktasjon er ikke undersøkt. Brukes kun etter nytte-/risikovurdering (Simparica).
<b>Endektocider</b>				
Advocate	H K	Moxidectin + imidakloprid	Sikkerhet ikke klarlagt. Bruk til drektige dyr er ikke anbefalt (Advocate).	Sikkerhet ikke klarlagt. Bruk til diegivende dyr er ikke anbefalt (Advocate).
Broadline	K	Eprinomectin + fipronil + (S)-metopren + prazikvantel	Skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av behandlende veterinær.	Skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av behandlende veterinær.
Interceptor vet.	H	Milbemycin	Studier med drektige hunder som fikk daglige doser med tre ganger anbefalt dosering viste ingen bivirkninger på tise eller avkom (Plumb). Kan benyttes til drektige tisper (Interceptor vet.).	Går over i melk, men ved standard doseringer har det ikke blitt sett bivirkninger hos diende valper (Plumb). Kan benyttes til lakterende tisper (Interceptor vet.).
Milbemax vet.	H K	Milbemycin + prazikvantel	Kan benyttes til drektige tisper og hunkatter (Milbemax vet.).	Kan benyttes til lakterende tisper og hunkatter (Milbemax vet.).
NexGard Spectra	H	Milbemycin + afoksolaner	Skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering av ansvarlig veterinær.	Skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering av ansvarlig veterinær.
Stronghold	H K	Selamectin	Kan brukes til drektige tisper/hunnkatter (Stronghold, Plumb).	Kan brukes til lakterende tisper/hunnkatter (Stronghold, Plumb).

Legemiddel	Dyre- art*	Virkestoff	Under drektighet	Under laktasjon
Stronghold Plus	K	Selamektin + sarolaner	Selamektin vurderes som trygt, men sikkerheten er ikke klarlagt for sarolaner. Kombinasjonen brukes til drektige hunnkatter i samsvar med veterinærens nytte-/risikovurdering.	Selamektin vurderes som trygt, men sikkerheten er ikke klarlagt for sarolaner. Kombinasjonen brukes til lakterende hunnkatter i samsvar med veterinærens nytte-/risikovurdering.

\*Hund/katt

Informasjonen i denne tabellen er hentet fra norske preparatomtaler og SPCer (per juni 2021) og elektronisk versjon av Plumb's Veterinary Drug Handbook.