

PREPARAT	TILBAKEHOLDELSESTIDER (25/10-18)	
	Geit, slakt	Geit, melk
Baytril vet inj 100 mg/ml	6	4
Borgal vet inj	10 (p.o., i.v.), 30 (i.m.)	3
Calci-kef vet inf 20,8 mg/ml	0	0
Calcimag vet inf	0	0
Curaverm vet mikstur 2,5 %	14	4
Ivomec vet mikstur 0,8 mg/ml	8	se b)
Ketamine Le Vet 100 mg/ml	1	0
Lidokel-Adrenalin vet inj 20 mg/ml/36 µg/ml	7	28
Panacur vet mikstur 25 mg/ml	16	6
Panacur vet pulver 40 mg/g	19	8,5
Panacur vet tablett 250 mg	21	7
Penovet vet inj 300 mg/ml	14	3
	6 (intrauterint)	
Streptocillin vet inj	30 (i.m., s.c.)	3
	6 (intrauterint)	
Terramycin vet oppløselig pulver 20 %	14	2 se a)
Tribrissen vet inj	Se c)	Se c)
Vetocin inj 10 IE/ml	0	0

a) Ved kraftforetning hos drøvtyggere

b) Geiter som produserer melk til menneskelig forbruk, kan ikke behandles under laktasjon eller innen 28 døgn før laktasjon

c) Skal ikke brukes til matproduserende dyr før en evt. MRL-vurdering av hjelpestoffet dietanolamin (fra 1/11-2018)