

PREPARAT	TILBAKEHOLDELSESTIDER (20/10-18)	
	Sau, slakt	Sau, melk
Apocillin tab 165 mg	28 (spelam)	
Baycox Sheep vet mikstur 50 mg/ml	42	se c)
Baycoxine mikstur 50 mg/ml	42	se c)
Bayticol vet liniment 10 mg/ml	10	
Baytril vet inj 100 mg/ml	4	3
Borgal vet inj	10 (p.o., i.v.), 30 (i.m.)	3
Calci-kel vet inf 20,8 mg/ml	0	0
Calcimag vet inf	0	0
Coopersect vet liniment 10 mg/ml	28	se c)
Curaverm vet mikstur 2,5 %	14	4
Dectomax vet inj 10 mg/ml	70 a)	se b)
Dihydrostreptomycin vet tab 500 mg	6	
Dysect vet påhellingsvæske 12,5 g/l	49	se c)
Ivermax mikstur 0,8 mg/ml	10	se d)
Ivomec vet inj 10 mg/ml	22	se d)
Ivomec vet mikstur 0,8 mg/ml	6	se e)
Ketamine Le Vet 100 mg/ml	1	0
Lidokel-Adrenalin vet inj 20 mg/ml/36 µg/ml	28	7
Malleva vet inj 40 mg/ml + 0,036 mg/ml	0	0
Panacur vet mikstur 25 mg/ml	16	6
Panacur vet pulver 40 mg/g	19	8,5
Panacur vet tabletter 250 mg	21	7
Penovet vet inj 300 mg/ml	14 (i.m., s.c.)	3
	6 (intrauterint)	
Procamidor vet inj 20 mg/ml	0	0
Streptocillin vet inj	30 (i.m., s.c.)	3
	6 (intrauterint)	
Terramycin vet inj 100 mg/ml	30 (i.m., s.c.)	3
	14 (i.v.); 6 (intrauterint)	
Terramycin vet oppløselig pulver 20 %	14	2 g)
Terramycin vet uteritorier 500 mg	6	3
Terramycin vet prolongatum inj 200 mg/ml	30	7
Tribriksen vet inj	se f)	se f)
Valbazen vet mikstur 19 mg/ml	14	4
Vetocin inj 10 IE/ml	0	0
Zactran inj 150 mg/ml	29	se h)

a) Dersom forhøyet dose (0,3 mg/kg) mot *Nematodirus battus* brukes,

anbefales det å legge til 10 dager til tilbakeholdelsestiden

b) Sau som produserer melk til konsum skal ikke behandles under laktasjonen eller de siste 70 døgn før lamming

c) Skal ikke brukes til sau som produserer melk til konsum

d) Skal ikke brukes til lakterende dyr som produserer melk til konsum.

Drektige dyr som skal produsere melk til konsum skal ikke behandles de siste 60 døgn før forventet fødsel.

e) Søyer som produserer melk til menneskelig forbruk, kan ikke behandles under laktasjon

eller innen 28 døgn før laktasjon

f) Skal ikke brukes til matproduserende dyr før en evt. MRL-vurdering av hjelpestoffet dietanolamin (fra 1/11-2018)

g) Ved kraftforforetning hos drøvtyggere

h) Drektige dyr som skal produsere melk til konsum skal ikke behandles etter 1 måned før forventet fødsel.